

Ormož, 19.12.2019

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE PRENOSA OŠPIC V ZDRAVSTVENIH USTANOVAH

(Priporočila so povzeta po Grgič Vitek M, Freljih T, Mrvič T, Tomažič J. Pojav ošpic v Sloveniji: ali smo pripravljene? In: Beović B, Strle F, Tomažič J, eds. Infektološki simpozij 2011; 2011 Apr 1-2; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Sekcija za protimikrobno zdravljenje; 2011).

Vzroki, ki pogojujejo prenos ošpic v zdravstvenih ustanovah, so lahko naslednji:

- osebe so običajno že kužne, preden je postavljena diagnoza ošpic (štiri dni pred pojavom izpuščaja),
- osebe z ošpicami običajno iščejo zdravniško pomoč v zdravstveni ustanovi,
- neprepoznavanje ošpic, zamuda pri diagnostiki...

Ošpice so zelo nalezljiva otroška bolezen, ki jo povzroča virus ošpic, za katero pa lahko zbolijo tudi odrasle osebe.

Ob pojavu značilnih bolezenskih znakov (vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in značilen rdečkast izpuščaj), o tem po telefonu takoj obvestimo izbranega osebnega zdravnika oz. pediatra in ostanemo doma.

Ob sumu da ste zboleli ali da je vaš otrok zbolel z ošpicami bolni nikakor ne vstopajte v prostore Zdravstvenega doma saj s tem dejanjem ogrožate vse ostale paciente in obiskovalce zdravstvenega doma.

Prvi stik z zdravnikom se vedno opravi samo preko telefona!

Dodatne informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

- <https://www.nijz.si/sl/ob-sumu-na-ospice-najprej-prek-telefona-obvestimo-svojega-zdravnika>
- <https://www.nijz.si/sl/ospice-1#pogosta-vprasanja-in-odgovori-o-ospicah-in-cepljenju-proti-ospicam,%20nasvete%20pred%20potovanjem%20v%20tujino%20pa%20na%20naslednji%20povezavi%20http://www.nijz.si/sl/ospice-nasveti-pred-potovanjem>

Predsednik KOBO

Dušan Kolarič, dr. med. spec. ped.

